

Veloucid[®] SPRAY D

Beskrivning

Spraybar kosmetisk emulsion för desinfektion av spenar efter mjölkning

Originalitet och mycket hög prestanda av **Veloucid[®] SPRAY D** formel beror på dess sammansättning: en riktig olja i vatten emulsion som ger enastående dermatologiska egenskaper. Den komplexa formeln ger säkerhet och appliceringskomfort under sprayning.

Veloucid[®] SPRAY D är den enda spraybart överaktivt täckande emulsionen.

Veloucid[®] SPRAY D har en återfuktande flytande formel, som baseras på PVP Jod, berikad med kosmetiska medel. Regelbunden användning efter mjölkningen bibehåller spenhuden i utmärkt skick, särskilt under kalla perioder.

Egenskaper:

Fysiska och kemiska egenskaper

Utseende:	ljusbrun vätska
Verksamt ämne:	jod (PVP)
Typ:	olja/vatten-emulsion
pH av den rena produkten:	4.4+/- 0.6
Densitet vid 20°C:	1.00+/-0.02
Frysningens känslighet:	0°C
Förvaringstemperatur:	0°C - 30°C

Lagstiftning

Biocid: Denna produkt innehåller ett anmält verksamt ämne enligt direktiv 98/8/EG och dess ändringar för typ 3 produkter: veterinärhygien.

Anmält aktiv substans: jod

Desinfektion

Baktericid

Veloucid® SPRAY D testades enligt standardmetoden EN 1656. I detta test var förhållandena i enighet med standarden:

Testtemperatur	:	30°C
Koncentration	:	89 %
Kontakt tid	:	30 minuter
Interferande ämne	:	1 % skummjörkpulver
Stammar	:	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 15442 <i>Proteus vulgaris</i> ATCC 13315 <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538 <i>Enterococcus hirae</i> ATCC 10541 <i>Streptococcus dysagalactiae</i> ATCC 27957 <i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 27956 <i>Streptococcus uberis</i> ATCC 27958

Resultat: för alla testade stammar under förhållandena enligt standarden EN 1656, ger Veloucid® SPRAY D en minskning med över 5 log.

Veloucid® SPRAY D testades också enligt standard EN 1656 under följande förhållanden:

Testtemperatur	:	20°C
Koncentration	:	80 %
Kontakt tid	:	10 minuter
Interferande ämne	:	10 % hel flytande UHT-mjörk

Resultat: under dessa tuffare förhållanden, ger Veloucid® SPRAY D en minskning med minst 5 log på de testade stammarna.

I ett annat test, var **Veloucid® SPRAY D** också testat enligt standardmetoden EN 1656 mot stammar av koagulasnegativa *Staphylococci* och alger *Prototheca zopfii* under följande förhållanden:

Testtemperatur	:	20°C
Koncentration	:	80 %
Kontakt tid	:	10 minuter
Interferande ämne	:	0 och 10 % hel flytande UHT-mjörk
Stammar	:	<i>Staphylococcus xylosus</i> <i>Staphylococcus chromogenes</i> <i>Staphylococcus simulans</i> <i>Staphylococcus epidermidis</i> <i>Staphylococcus hominis</i> <i>Staphylococcus hyicus</i> (saml. ENV, Toulouse, Frankrike) <i>Prototheca zopfii</i> (saml. Dr. Bertocchi, Brescia, Italien)

Resultat: under dessa förhållanden, ger Veloucid® SPRAY D en minskning med över 5 log för de testade koagulas-negativa stammar av *Staphylococci*. För *Prototheca zopfii*, ger Veloucid® SPRAY D en minskning med minst 4 log för den testade stammen.

Veloucid® SPRAY D var också testat enligt standardmetoden EN 1276 mot 2 stammar av Meticillinresistent *Staphylococcus aureus* (MRSA) under följande förhållanden:

Testtemperatur	:	20°C
Koncentration	:	80 %
Kontakt tid	:	10 minuter
Interferande ämne	:	10 % hel flytande UHT-mjölk
Stammar	:	<i>Staphylococcus aureus</i> CIP 107397 och CIP 107422

Resultat: under dessa förhållanden, ger Veloucid® SPRAY D en minskning med över 5 log för stammar av *Staphylococcus aureus* CIP 107397 och en minskning med över 4 log för stammen av *Staphylococcus aureus* CIP 107422.

I ett annat test, var **Veloucid® SPRAY D** också testat enligt standardmetoder EN 14348 och EN 14204 i en stam av mykobakterier under följande förhållanden:

Testtemperatur	:	20°C
Koncentration	:	90 %
Kontakt tid	:	10 minuter
Stamm	:	<i>Mycobacterium terrae</i> CIP 104321

Resultat: under dessa förhållanden ger Veloucid® SPRAY D en minskning med över 5 log för den testade stammen av mykobakterier.

Användningsområde

Desinfektion av spenar efter mjölkning.

Anvisningar

Veloucid® SPRAY D är färdig att använda för sprayning efter mjölkning. Användning av **Veloucid® SPRAY D** innebär även rengöring av spenarna innan följande mjölkning.

Utrustning

Manuell eller automatisk sprayning

Toxicitet

Veloucid® SPRAY D är inte giftig under normala användningsförhållanden.

Säkerhet och försiktighetsåtgärder

Varje gång en kemikalie kommer i kontakt med huden, ögonen, etc. .. skölj noga med vatten och vid behov, kontakta en läkare så snart som möjligt.

Om produkten oavsiktligt förtärs, tvätta munnen rikligt med vatten. Drick icke kolsyrat vatten och vid behov, kontakta en läkare så snart som möjligt.

I allmänhet bör alla blandningar av kemikalier undvikas, i synnerhet en alkalisk med en syra, eftersom denna blandning ger upphov till en mycket farlig exoterm reaktion.

Säkerhetsdatablad finns tillgängligt på begäran